

Maladies infectieuses : Interventions en milieu scolaire

Diagnostic médical nécessaire <i>Sauf pour gastro-entérite, pédiculose et varicelle</i>	École	Infirmière	Exclusion de l'école	Lettre aux parents et au personnel	
	À signaler à l'infirmière scolaire	Éclosion à signaler à la DSPu ³		Un cas validé	2 cas validés ou plus
Conjonctivite	Oui ²	Oui (≥ 3 cas)	Non	Non	Oui (≥ 3 cas) Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits
Coqueluche ¹	Oui	Oui	Primaire et secondaire : Aucune exclusion, port du masque recommandé durant la période de contagiosité (MAJ sept 2024)	Oui, par la DSPu	Oui, par la DSPu
Érythème infectieux (5 ^e maladie)	Oui	Non	Non	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits	Oui Primaire : oui, si non fait au cours des 3 derniers mois Secondaire : contacts étroits
Gale	Oui	Oui	Oui, jusqu'à ce que le premier traitement ait été complété	Oui Primaire : contacts étroits Secondaire : contacts étroits	Oui ⁵ Primaire : contacts étroits Secondaire : contacts étroits
Gastro-entérite	Oui ²	Oui	Selon les critères généraux de la figure 1 du chapitre 3 ⁴	Non	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits
Hépatite A ¹	Oui	Oui	Oui, jusqu'à 7 jours après le début de l'ictère ou des symptômes si l'ictère est absent	Oui, par la DSPu	Oui, par la DSPu
Influenza (grippe)	Oui ²	Oui	Selon les critères généraux de la figure 1 du chapitre 3 ⁴	Non	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Pneumonie à mycoplasme)	Oui	Oui	Selon les critères généraux de la figure 1 du chapitre 3 ⁴	Non	Non
Oreillons ¹	Oui	Oui	Oui, jusqu'à 5 jours après le début du gonflement	Oui, par la DSPu	Oui, par la DSPu
Oxyures	Oui	Non	Non	Non	Primaire : si plusieurs cas à l'intérieur d'une période de 2 mois dans la même classe. Référer à l'infirmière CLSC.
Pédiculose (poux)	Oui	Non	Non	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits
Pieds-mains-bouche (entérovirus)	Oui	Non	Non	Non	Primaire : si plusieurs cas dans la même classe. Référer à l'infirmière CLSC.
Pharyngite ou impétigo à streptocoque du groupe A (SGA)	Oui	Non	Oui, jusqu'à 24 heures après le début du traitement	Non	Oui Primaire : contacts étroits Secondaire : contacts étroits
Rougeole ¹	Oui	Oui	Oui, jusqu'à 4 jours après le début de l'éruption	Oui, par la DSPu	Oui, par la DSPu
Rubéole ¹	Oui	Oui	Oui, jusqu'à 7 jours après le début de l'éruption	Oui, par la DSPu	Oui, par la DSPu
Teigne du cuir chevelu ou du corps	Oui	Non	Non	Non	Oui Primaire : contacts étroits Secondaire : contacts étroits
Varicelle	Oui	Non	Selon les critères généraux de la figure 1 du chapitre 3 ⁴	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits	Oui Primaire : à la classe Secondaire : contacts étroits
Morsure humaine ou animale	Une consultation médicale est recommandée s'il y a bris de peau pour le mordeur et le mordu. Valider avec Info-Santé au besoin. Si morsure animale, consultez l'outil d'aide à la décision rage : https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/accueil.php?situation=Rage				

- Notes :
1. Maladie à déclaration obligatoire (MADO)
 2. Si 2 cas et plus dans un même groupe ou ayant un lien entre eux
 3. Si présence de 2 cas et plus avec un lien entre eux (autre que fratrie) : remplir le formulaire de signalement d'éclosion (<https://www.ciuss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/mado>) et le transmettre à la DSPu par télécopier au 418 661-7153 ou par courriel à : 03drsppostedegarde@ssss.gouv.qc.ca
 4. Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/>
 5. Si les cas surviennent à l'intérieur de 6 semaines